

haut, mesurant les deux tiers de la longueur de la tête. On compte seize écailles autour du pédicule caudal. La caudale échancrée est écailleuse, à lobes obtusément pointus.

La coloration est ardoisée au-dessus, violacée sur les côtés et sur le ventre.

D. 13 - 14; A. 64; P. 11; V. 6; Ec. 18 | 105 | 20-23.

N° 04 - 111 - 112. Coll. Mus. — Fort-Archambault : Mission Charil-Lac Tchad (Chevalier-Decorse).

Longueur : 270 + 35 = 305 et 150 + 10 = 160 millimètres.

Ces Poissons sont assez voisins d'*Hyperopisus bebe* Lacépède, du Nil et du Sénégal, la seule espèce du genre connue. Ils s'en distinguent principalement par la plus grande longueur du pédicule caudal et, en conséquence, le moindre nombre d'écailles autour de celui-ci; par le menton plus globuleux, la livrée plus sombre.

HALICTUS ET SPHECODES PROVENANT DES CHASSES DE M. LE D^r G. RIVET,
à RIOBAMBA, ÉCUADOR,

PAR M. J. VACHAL (ARGENTAT).

1. *H. Riveti* ♀ ♂, nov. sp.

Très semblable à *H. alticola* (Vach. in *Revue d'entomologie*, Caen, 1904, p. 23), en diffère dans le sexe féminin par sa tête plus petite, sa face plus étroite (les ocelles pairs à peine plus rapprochés entre eux que de l'œil), le *scutum nasale* écrasé, noir mat, entouré plus ou moins d'un liséré cuivreux mat, par l'espace cordiforme long, comme ogival, mat, ayant à peine le bout métallique, et par la paroi anale plus rétrécie dans sa partie supérieure. Le ♂ a le *scutum nasale* normal, métallique; il diffère en outre de *H. alticola* par l'intervalle oculo-mandibulaire aussi long que la largeur de la base de la mandibule, et par le chaperon, plus allongé et plus projeté en avant.

♀ longueur, 8-9 millimètres; aile, 6-6 millim. 5; ♂ longueur 7 millim. 5; aile, 6 millimètres.

3 ♀ et 1 ♂.

2. *H. antarius* ♀, nov. sp.

Ressemble, quant à la couleur, à *H. purpurissus* (Vach. *Misc. entomol.*, Narbonne, 1903, p. 98), mais en diffère par sa tête plus petite, sa face bien moins large et bien moins longue, à orbites à peine convergentes en bas, ses joues nulles (dans *H. purpurissus* presque aussi longue que la largeur de la base de la mandibule), et par son tibia postérieur et la base du prototarse 3 testacés.

Longueur, 6 millim. 5; aile, 5 millimètres. 1 ♀.

Ces deux espèces appartiennent au groupe que j'ai désigné sous le nom de *Paragapostemon*.

3. **H. (Augochl.) notares** ♀, nov. sp.

Abdomen, trunci latera et pars postica œneo-viridia, facies et scutellum cupreo micantia, mesonotum nigrescens plus minus hinc illinc cupreo niteus. Antennæ, tegulæ, tibiæ posticæ et tarsi omnes nigri.

Tête, tronc et ventre garnis de petits poils dressés, peu épais, gris-roussâtre sur la face, bruns au vertex, noirâtres sur le disque du mésonotum, blancs sous le ventre, fauves sous le prototarse 3; brosse tibiale obscure. Aile grisâtre à nervures foncées; éperon de la patte 3 blond à 3 épines. Aire dorsale du segment médiaire grande, tout entière occupée par des stries très fines, très nombreuses, devenant obsolètes en arrière.

Longueur, 9 millimètres; aile, 7 millim. 5. 1 ♀.

4. **H. (Augochl.) Joannisi** (Vach., in *Misc. entomol.*, 1904, p. 19 et 24). 2 ♂.

5. **Sphecodes equator** ♂, nov. sp.

Niger, mandibulis dimidio apicali testaceis.

Aile hyaline, nervures brunes, cellule cubitale 2 plus étroite le long de la nervure radiale. Antennes courtes, l'article 4 à peine plus long que 3. Mésonotum et scutellum brillants, à ponctuation presque fine, assez dense. Aire dorsale du segment médiaire en croissant, tout entière occupée par des rides longitudinales grosses. Abdomen brillant à pointillé visible seulement sous un fort grossissement, à dépressions lisses.

Longueur, 4 millim. 75; aile, 3 millim. 5. 1 ♂.

Le tout au Muséum de Paris.

UN NOUVEAU GENRE DU GROUPE DES NATALICOLARIA (TESSARATOMINÆ)
DE L'INDE MÉRIDIONALE (HÉMIPTÈRES),

PAR M. JOANNY MARTIN.

Le groupe des *Natalicolaria* (Horwath) n'était, jusqu'à présent, répandu qu'en Afrique, où il semblait en être l'une des caractéristiques. Le genre que nous faisons connaître étend la répartition de ce groupe jusque dans l'Inde, et il est permis de croire que l'on trouvera quelques-uns de ses représentants à Madagascar où ils sont encore inconnus.